

Saúde da mulher



Quando se fala da saúde da mulher, tratamos das doenças ou condições exclusivas das mulheres ou que envolvem diferenças sexuais particularmente importantes para elas. Essa definição reconhece as crescentes evidências científicas que sustentam um enfoque direcionado para sexo e gênero, expandindo o conceito de saúde da mulher para além da ênfase tradicional nos órgãos reprodutivos e suas funções.

Com o tempo, a definição passou a incluir uma apreciação acerca do bem-estar e da prevenção, da interdisciplinaridade e da natureza holística da saúde da mulher, da diversidade das mulheres e suas necessidades de saúde ao longo da vida e do papel central das mulheres como pacientes participantes ativas da própria assistência à saúde que recebem.

Câncer de mama

Os marcadores tumorais ou marcadores biológicos, são macromoléculas presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento e/ou alteração em sua concentração está relacionado com a gênese e o crescimento de células neoplásicas (câncer).

NOME DO EXAME	APLICAÇÃO
CA 15-3	Marcador tumoral utilizado para monitoramento e detecção de recidivas, o mais sensível e específico.
CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO	O CEA pertence a um grupo de marcadores tumorais conhecidos como proteínas oncofetais. Níveis elevados de CEA no soro foram detectados em indivíduos com cânceres do trato gastrointestinal, da mama, do pulmão, do ovário, do fígado e do pâncreas.
CA 27 - 29	Similarmente ao antígeno CA 15-3, o CA 27,29 é encontrado no sangue da maioria das pacientes de câncer de mama.
BRCA1 - DETECÇÃO DE MUTAÇÃO - SEQUÊNCIAMENTO E MLPA	O BRCA1 é um gene supressor de tumor humano principalmente no câncer de mama.
BRCA2 - DETECÇÃO DE MUTAÇÃO - SEQUÊNCIAMENTO E MLPA	Mulheres com mutação em BRCA2, localizado em 13q12.13, possuem cerca de 85% de chance de desenvolverem um carcinoma de mama durante sua vida.

Outros Marcadores Tumorais

NOME DO EXAME	APLICAÇÃO
CA 125	É o marcador tumoral utilizado principalmente para o câncer de ovário, sendo também útil para o câncer de endométrio e endometriose.
CA 19-9	É um marcador tumoral do trato gastrointestinal, em câncer de pâncreas e trato biliar como primeira escolha e no câncer colorretal como segunda escolha.

Câncer do colo do útero

O câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente entre brasileiras, sendo superado apenas pelo câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2010, foram registrados mais de 18 mil novos casos, com aproximadamente cinco mil mortes, uma média de 13 mulheres por dia.

Se diagnosticado precocemente, o câncer do colo do útero tem tratamento e cura. De acordo com o Ministério da Saúde, no sistema atual, mais de 70% das pacientes diagnosticadas com a doença apresentam estágios avançados já na primeira consulta, o que limita muito a possibilidade de cura. Estima-se que cerca de 40% das brasileiras nunca tenham sido submetidas ao exame de Papanicolaou, o que eleva a taxa de mortalidade por esse tipo de câncer.